

Валідована шкала для загальної оцінки АД дослідником (vIGA-ADTM)

Інструкції:

Оцінка за шкалою IGA обирається за допомогою наведених нижче дескрипторів, які найкраще описують загальний вигляд уражень у певний момент часу. Не обов'язково, щоб були присутні всі характеристики з рубрики «Морфологічний опис».

БАЛ	СТУПІНЬ	МОРФОЛОГІЧНИЙ ОПИС
☐ 0	Чисто	Відсутні запальні ознаки атопічного дерматиту (немає еритеми, індурації/папуляції, ліхеніфікації, немає мокнuttя/утворення кірок). Може бути присутня післязапальна гіперпігментація та/або гіпопігментація.
☐ 1	Майже чисто	Ледь помітна еритема, ледь помітна індурація/папуляція та/або мінімальна ліхеніфікація. Відсутнє мокнuttя чи утворення кірок.
☐ 2	Легкий	Слабка, але чітка еритема (рожевий колір), слабка, але чітка індурація/папуляція та/або слабка, але чітка ліхеніфікація. Відсутнє мокнuttя чи утворення кірок.
☐ 3	Помірний	Чітко помітна еритема (темно-червона), чітко помітна індурація/папуляція та/або чітко помітна ліхеніфікація. Може бути присутнє мокнuttя та утворення кірок.
☐ 4	Тяжкий	Виражена еритема (темно-червона або яскраво-червона), виражена індурація/папуляція та/або виражена ліхеніфікація. Захворювання поширене. Може бути присутнє мокнuttя чи утворення кірок.

Примітки:

- У невизначених випадках, будь ласка, використовуйте поширеність уражень для розмежування балів.
Наприклад:
 - Пацієнт із вираженою еритемою (темно-червона або яскраво-червона), вираженою папуляцією та/або вираженою ліхеніфікацією, обмеженою за поширеністю, буде віднесений до категорії «3 – Помірний».
- Екскоріації не слід враховувати при оцінці тяжкості захворювання.